

FICHA TÉCNICA METIOFAN® 50 SC

1/2

Tipo de producto: Fungicida- tiocarbamato

Ingrediente activo: Metiltiofanato

Concentración y Formulación: 50 SC (Suspensión concentrada)

Modo de acción: Sistémico

Número de Registro MAG: 3599

Principales características:


METIOFAN 50 SC es un fungicida a base de metiltiofanato, y su forma de acción es sistémico, preventivo y curativo. Utilizado para el control de enfermedades en cultivos de mucha importancia como las hortalizas y el café. Su formulación al 50% SC lo hace un producto compatible y seguro.

Recomendaciones de uso:

Nombres comunes y científicos de las enfermedades a combatir	Nombres comunes y científicos de las plantas a proteger
Antracnosis (<i>Collectotrichum spp</i>)	Café (<i>Coffea arabica sp</i>)
Mancha viruela (<i>Cercospora arachidicola</i>)	Maní (<i>Arachis hipogea</i>)
Mancha cercospora (<i>Cercospora spp</i>)	Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)
Chasparria (<i>Cercospora coffeicola</i>)	Melón (<i>Cucumis melo</i>)
Ojo de sapo (<i>Cercospora nicotianae</i>)	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)
	Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)

Dosis, época e intervalo de aplicación:

Tomate: 1.0-1.4L/ha. Realice las aplicaciones con intervalos de 7-14 días. Inicie las aplicaciones a los primeros síntomas, se recomienda mezclar o alternar su aplicación con un fungicida protector como los carbamatos. Aplicar con un volumen de 300 a 400 litros de agua.



FICHA TÉCNICA METIOFAN® 50 SC

2/2

Tabaco: 1.0-1.4L/ha. Asperjar bien todo el follaje sobre todo después de la capa, se recomienda mezclar o alternar su aplicación con un fungicida protector como los carbamatos. Aplicar con un volumen de 300 a 400 litros de agua.

Café: 0.7-1.0L/ha. Aplique cubriendo uniformemente el follaje y frutos recién formados, se recomienda mezclar o alternar su aplicación con un fungicida protector como los carbamatos. Aplicar con un volumen de 300 a 400 litros de agua.

Melón, Pepino: 0.7-1.0L/ha. Realice las aplicaciones con intervalos de 7-14 días. Inicie las aplicaciones a los primeros síntomas, se recomienda mezclar o alternar su aplicación con un fungicida protector como los carbamatos. Aplicar con un volumen de 300 a 400 litros de agua.

Maní: 0.7-1.0L/ha con un volumen de 300 a 400 litros de caldo por hectárea. Realice las aplicaciones a los primeros síntomas, se recomienda mezclar o alternar su aplicación con un fungicida protector como los carbamatos. Aplicar con un volumen de 300 a 400 litros de agua.

Período de reingreso al área tratada:

Debe esperar a que seque el rocío aplicado. En caso de ser necesario el reingreso al área tratada durante el periodo, use equipo de protección completo.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

Tomate:	8 días
Tabaco:	15 días
Café:	20 días
Melón, pepino y maní:	10 días

Compatibilidad:

Este producto es compatible con productos de uso normal tales como ditiocarbamatos. Es incompatible con productos alcalinos como el caldo bordelés, sulfuro de calcio y cal corriente.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico en la dosis recomendada.