

## FICHA TÉCNICA NOBLE® 25 WP

1/2

**Tipo de producto:** Fungicida

**Ingrediente activo:** Triadimefón

**Composición química:** 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1(1H-1,2,4-triazol-1il)

**Grupo químico:** Triazol

**Concentración y Formulación:** 25% p/p (Polvo mojable)

**Modo de acción:** Sistémico

**Número de Registro MAG:** 3859

**Principales características:**


NOBLE 25 WP, es un fungicida sistémico con un amplio espectro de eficacia contra enfermedades fungosas en cultivos de campo: frutales, hortalizas, café y césped. NOBLE 25 WP es usado como aspersor protectante o luego del inicio de la afección.

**Cultivos a tratar:** Piña (*Ananas comosus*), Café (*Coffea arábica*), Rosas (*Rosas sp.*)  
Crisantemos (*Chrysanthemum sp.*)

**Compatibilidad:** Es compatible productos formulados; Polvos mojables, insecticidas y fungicidas. NO debe ser mezclado con Herbicidas, otros pesticidas o aceites agrícolas.

**Observaciones:** La mezcla debe ser usada inmediatamente después de la preparación

**Período de reingreso al área tratada:** No existen restricciones



## FICHA TÉCNICA NOBLE® 25 WP

2/2

### Dosis a emplear por cultivo:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Tiempo de carencia
Piña ( <i>Ananas comosus</i> )	<p>Pudrición del fruto o corona (<i>Ceratocytis paradoxa</i>)</p> <p>Pudrición del fruto o corona (<i>Thielaviopsis paradoxa</i>)</p>	0,5 kg/Ha	Aplicar en aspersión en el "hoyo" de plantación, repetir al follaje 30-45 días después de la plantación	Última aplicación 50 días antes del corte
Café (Coffea arábica)	<p>Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)</p> <p>Puccinia sp. (<i>Gymnosporangium sp</i>)</p> <p>Uromyces sp. (<i>Phragmidium sp</i>)</p>	<p>0,75 kg/ha</p> <p>1,0 kg/Ha</p> <p>1,0 kg/Ha</p>	<p>Tratamiento preventivo</p> <p>Tratamiento preventivo</p> <p>Tratamiento preventivo</p>	30 días
Rosas ( <i>Rosas sp</i> )	Mildiu polvoso ( <i>Shaerotheca pannosa</i> )	0,15-0,20,kg en 200 litros de agua	<p>Iniciar las aplicaciones con la dosis al detectar los primeros síntomas, si la infección ya está bien establecida, es preferible emplear la dosis mayor.</p> <p>Repetir según la infección</p>	
Crisantemos ( <i>Chrysanthemus sp</i> )	<p>Oídio</p> <p>Royas</p>	0,35 a 0,5 kg/Ha	<p>Iniciar las aplicaciones con la dosis al detectar los primeros síntomas, si la infección ya está bien establecida, es preferible emplear la dosis mayor.</p> <p>Repetir según la infección</p>	

### Precauciones:

Puede causar daño severo a los ojos e irritación en la piel, por lo tanto evite su contacto con la piel, ojos y ropa. Dañino si se ingiere o se inhala. Para su manipulación debe utilizarse el equipo de protección completo: guantes de protección, overol, botas, mascara de protección facial. No comer, fumar o beber durante su manipulación.