

FICHA TÉCNICA TEBEFOL® 80 WP

1/2

Tipo de producto: Fungicida

Ingrediente activo: Fosetil-Aluminio

Composición química: Aluminium tris (O-ethyl phosphonate)

Grupo químico: Fosfónico

Concentración y Formulación: 80% p/p (Polvo mojable)

Modo de acción: Sistémico

Número de Registro MAG: 4184

Principales características:

TEBEFOL 80 WP, es un fungicida fosfónico con acción sistémica, siendo absorbido tanto por follaje como por las raíces, desplazándose dentro de la planta vía floema (movimiento dentro de la planta incluyendo la raíz) y xilema (movimiento de la raíz a la planta). En el hongo interfiere la síntesis de enzimas, inhibe la germinación de esporas y bloquea el desarrollo de los micelios

Cultivos a tratar:

Piña (*Ananas comosus*), Cebolla (*Allium cepa*), Cítricos (*Citrus sp.*), Crucíferas (*Brassica oleracea*) Fresa (*Fragaria sp.*), Ornamentales.


Período de reingreso al área tratada: Esperar a que se seque el rocío.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Piña: 90 días

En los demás cultivos 15 días

Compatibilidad:

Incompatible con sustancias fuertemente alcalinas como Caldo Bordelés. Es compatible con la mayoría de pesticidas.



FICHA TÉCNICA TEBEFOL® 80 W

2/2

Dosis a emplear por cultivo:

Cultivo	Enfermedad	Dosis kg/ha	Observaciones
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Podredumbre del corazón (<i>Phytophthora parasítica</i>)	4,0 – 5,0	Por inmersión báñese las hojas antes del trasplante para una protección de 60 días. Aplique en intervalos de 60 días.
Cítricos (<i>Citrus sp</i>)	Gomosis de los cítricos (<i>Phytophthora sp</i>)	4,0 – 5,0	Aplique 2 veces durante el período vegetativo, cada 90 días
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu Polvoso (<i>Peronospora destructor</i>)	2,5	Aplique al observarse el primer síntoma de la enfermedad, con frecuencia de 15 días
Crucíferas (<i>Brassica oleracea</i>)	Mildiu veloso (<i>Peronospora parasítica</i>)	2,5	Aplique 4-5 veces en el ciclo.
Fresa (<i>Fragaria sp</i>)	Podredumbre del corazón (<i>Phytophthora parasítica</i>)	2,5	Báñese los esquejes por 15-30 minutos. Aplíquese 14-24 días después de la siembra
Ornamentales	Podredumbre de las plantas (<i>Phytophthora sp</i>) Mildiu veloso (<i>Peronospora</i>)	3,0 - 4,0	Por inmersión o riego.